

### Contenido

- [FÁRMACOS DE 1º LÍNEA EN EL TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES ADVERSAS AGUDAS GRAVES.](#)
- [ADRENALINA](#)
- [Presentación:](#)
- [Vía de administración](#)
  
- [VALIUM \(DIACEPAN\):](#)
- [Presentación:](#)
- [Vía de administración:](#)
- [NIÑOS](#)
  
- [PRIMPERAN: \(METOCLOPRAMIDA\)](#)
- [Presentación:](#)
- [Vía de administración:](#)
  
- [POLARAMINE \(MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA\):](#)
- [Presentación:](#)
- [Vía de administración:](#)

## **FÁRMACOS DE 1º LÍNEA EN EL TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES ADVERSAS AGUDAS GRAVES.**

### **ADRENALINA**

#### **Presentación:**

AMPOLLAS Y JERINGAS PRECARGADAS 1/1000 (1ML CON 1 MG).

#### **Vía de administración**

DEPENDERA DE LA GRAVEDAD DE LA REACCIÓN:

- **SUBCUTÁNEA**
- En reacciones leves:

## Medicamentos en las reacciones adversas graves

Escrito por Administrator

Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:17 - Última actualización Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:28

---

- Pauta: 0,4ml (1/3 JERINGA PRECARGADA)
- **Si no hay respuesta puede repetirse cada 20min hasta en 3 ocasiones.**
  
- **INTRAVENOSA (IV)**
- En reacciones moderadas o graves
- Diluir 1 Amp. en 9ml de SSF y se administra 4ml, con un intervalo de 10 min. hasta en 3 ocasiones.
- **PERFUSIÓN:**
- Cuando no hay respuesta)
- Diluir 3 Amp en 250 SG 5%, comenzando la perfusión a 5ml/h aumentando si se requiere 50ml/h.

### **VALIUM (DIACEPAN):**

#### **Presentación:**

- AMPOLLAS 2ML CON 10 MG. \_\_\_\_\_

#### **Vía de administración:**

- **INTRAVENOSA (IV)**
- DILUCION 1 AMP en 8ML de Suero fisiológico.
  
- PERFUSION LENTA APROX 2ML/MIN.
- SI NO hay respuesta:
- REPETIR DOSIS MISMA DOSIS. **HASTA UN MAXIMO DE 40MG. (RIESGO DE PARADA CARDIORESPIRATORIA).**

### **NIÑOS**

- INTRARECTAL
- STESOLID 4MG

NOTA:RETIRAR LA CANULA UNA VEZ APLICADO SIN DEJAR DE COMPRIMIR

### **PRIMPERAN: (METOCLOPRAMIDA)**

#### **Presentación:**

## **Medicamentos en las reacciones adversas graves**

Escrito por Administrator

Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:17 - Última actualización Sábado 03 de Noviembre de 2012 18:28

---

- AMPOLLAS DE 10MG.

### **Vía de administración:**

- IV ó IM. 1 AMP sin diluir en infusión lenta.

## **POLARAMINE (MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA):**

### **Presentación:**

- AMPOLLAS DE 5MG.

### **Vía de administración:**

- IV ó IM. 1 AMP sin diluir en infusión lenta.